

**1.- Qual é o factor mais importante e influente na patogénese da ITU?**

- a) O estado dos mecanismos de defesa do hospedador.
- b) A virulência bacteriana.
- c) O número de organismos invasores.
- d) Os patógenos bacterianos.
- e) A resistência bacteriana.

**3.- Qual é a causa mais frequente do FLUTD?**

- a) Cistite Intersticial Idiopática Felina.
- b) Infecção de trato urinário.
- c) Urolitíase.
- d) Cristalúria.
- e) Plugs (tapões de proteínas que atrapam os cristais) na uretra.

**2.- A respeito do diagnóstico/ seguimento/tratamento das ITU deveremos fazer idealmente (se não existir bacteriúria visível no sedimento urinário):**

- a) Uma cultura urinária e antibiograma.
- b) Duas culturas urinárias /antibiograma.
- c) Três culturas urinárias/antibiograma.
- d) Quatro culturas urinárias/antibiograma.
- e) Cinco culturas urinárias/antibiograma.

**4.- A respeito da Inflamação do Trato Urinário Inferior dos Felinos (FLUTD) assinale a hipótese DISCORDANTE:**

- a) A forma obstrutiva é mais frequente nos machos.
- b) A etiologia não é, na maior parte dos casos, determinada.
- c) É uma patologia que pode levar a morte do animal.
- d) A cultura urinária é muito frequentemente positiva.
- e) A característica comum a qualquer apresentação é a inflamação das vias urinárias.

**5.- A respeito do tratamento da Inflamação do Trato Urinário Inferior dos Felinos (FLUTD) assinale a hipótese DISCORDANTE:**

- a) A base do tratamento do estresse deve ser farmacológica (p.ex. L-cetazepina, triptofano ou feromonas).
- b) Analgesia está contra-indicada.
- c) GAG (GlucosAminoGlicanos) são sempre de utilidade.
- d) A característica comum a qualquer apresentação é a presença de cristais nas vias urinárias.
- e) O tratamento deve ser multi-modal.

**1.- Qual é o factor mais importante e influente na patogénese da ITU?**

- a) O estado dos mecanismos de defesa do hospedador.
- b) A virulência bacteriana.
- c) O número de organismos invasores.
- d) Os patógenos bacterianos.
- e) A resistência bacteriana.

**2.- A respeito do diagnóstico/ seguimento/tratamento das ITU deveremos fazer idealmente (se não existir bacteriúria visível no sedimento urinário):**

- a) Uma cultura urinária e antibiograma.
- b) Duas culturas urinárias /antibiograma.
- c) Três culturas urinárias/antibiograma.
- d) Quatro culturas urinárias/antibiograma.
- e) Cinco culturas urinárias/antibiograma.

3.- Qual é a causa mais frequente do FLUTD?

- a) **Cistite Intersticial Idiopática Felina.**
- b) Infecção de trato urinário.
- c) Urolitíase.
- d) Cristalúria.
- e) Plugs (tapões de proteínas que  
atrapam os cristais) na uretra.

5.- A respeito do tratamento da Inflamação do Trato Urinário Inferior dos Felinos (FLUTD) assinale a hipótese **DISCORDANTE**:

- a) A base do tratamento do estresse deve ser farmacológica (p.ex. L-cetozepina, triptófano ou feromonas).
- b) Analgesia está contra-indicada.
- c) GAG (GlucosAminoGlicanos) são sempre de utilidade.
- d) A característica comum a qualquer apresentação é a presença de cristais nas vias urinárias.
- e) **O tratamento deve ser multi-modal. (V)**

4.- A respeito da Inflamação do Trato Urinário Inferior dos Felinos (FLUTD) assinale a hipótese **DISCORDANTE**:

- a) A forma obstrutiva é mais frequente nos machos.
- b) A etiologia não é, na maior parte dos casos, determinada.
- c) É uma patologia que pode levar a morte do animal.
- d) **A cultura urinária é muito frequentemente positiva.**
- e) A característica comum a qualquer apresentação é a inflamação das vias urinárias.